SERPA RAT GRANO

Bromadiolona 0,005%

CEBO EN GRANO, LISTO PARA SU USO

COPIA NO VÁLIDA

ORGANISMOS DIANA, EFICACIA Y DESARROLLO DE RESISTENCIAS

Los organismos diana son la Rata Gris (*Rattus norvegicus*) y el Ratón común (*Mus musculus*). El producto SERPA RAT GRANO BROMADIOLONA 0,005% es un rodenticida anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones tanto juveniles como subadultos. Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de las roedores a la bromadiolona antes de comenzar el tratamiento. Después de la campaña de control, se deberán comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos.

INSTRUCCIONES DE USO

Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación. Retirar la comida fácilmente disponible para las roedores (p.j. restos sueltos o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona 3 meses antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, señal de excitación, cadáveres, orujeros, excrementos...). Cuanto más posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el periodo de tratamiento y esa señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios.

Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos para humanos, bebidas, alimentos para animales o las superficies de preparación de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y control, una vez posible, indicados fuera de control.

Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas realizadas al comienzo del tratamiento. Las frecuencias deben ser consistentes con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de buenas prácticas. Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación de cebo. El desarrollo de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinar la causa. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa. No aplicar la dosis que contiene el cebo. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas. En infestaciones, retirar el producto sobrante al final del tratamiento.

Antidotos de edificaciones, proteger fuentes de las condiciones atmosféricas (p.j. lluvia, nieve, etc.). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Retirar el producto sobrante al Final del tratamiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cebo en grano, en portacebos antideslizantes a la manipulación, en bolsitas.

CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional especializado.

DOSIS

ESPECIE:	DOSIS:	ÁMBITO DE UTILIZACIÓN:
Ratas (*Rattus ver sp.*)	Portacebos con 100-200 gramos por punto de cebo.	Interiores y alrededores de edificaciones
Ratones (*Mus musculus*)	Portacebos con 50-100 gramos por punto de cebo.	Interiores.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

Siempre que posible, antes del tratamiento informar a los trabajadores sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas), el día final. No utilizar en áreas donde se sospecha que existe resistencia a la sustancia activa. Los productos No deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento. No alternar el uso del ingrediente activo anticoagulantes con otras de diferente comportamiento o mezclar con el propósito de prolongar las distancias. Si se observan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente. No tener los portacebos u otras utensilios utilizados en los puntos de cebo cebados o protegidos con agua entre aplicaciones.

Aplicar medidas de control preventivas (p.j.: higiene adecuada, retirar comida y bebida en la medida de lo posible). Para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de rechazo. Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas. No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para tratar durante la actividad de los roedores. No usar el producto en tratamientos de contacto por pulsos.

INTERIORES:

Este producto solo se utilizará en lugares no accesibles para fuera al animales no objetivo.

ALREDEDOR DE EDIFICACIONES:

No aplicar el producto directamente en madrigueras.

LEA Y SIGA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN DE ACOMPAÑE AL PRODUCTO. ESTA PROPORCIONADA EN EL PUNTO DE VENTA ANTES DE USARLA.

PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden tardar varios días en aparecer hasta un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos graves, puede haber hematomas y presencia de sangre en heces o orina.

Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

En caso de exposición dérmica, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón. En caso de exposición ocular, comprobar siempre la presencia de lentes de contacto y retirarlas, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 15 minutos. En caso de exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, buscar consejo médico inmediato y mostrar la etiqueta o el envase. Consulte a un médico en caso de que la irritación persista. Si el producto se ingiere accidentalmente, busque atención médica inmediata y muestre el envase o la etiqueta. No provoque el vómito. Consulte con un veterinario en caso de que la irritación persista.

Durante las pulverizaciones cerca de aguas superficiales (p.j. ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de regadío, etc.) o sistemas de drenaje de aguas residuales de que el cebo no entre en contacto con el agua.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE:

PELIGRO

Al final del tratamiento eliminamos el cebo no consumido, el envase y los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja. El producto se mantiene durante 2 años. Puede dañar el feto. Provoca daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Solicite instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar el polvo. Llevar ropa de protección apropiada para la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar guantes de protección. Consultar a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente/el envase/los envases vacíos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Nº de registro: ES/APP/(NN)-2018-14-0017.a

Contenido: 25 Kg ℮ (en bolsitas de 25 gr. aprox)

COMPOSICIÓN:

Bromadiolona [p.a.] CAS 28772-56-7 0,005%

Sustancia de sabor amargo 0,0025% - Excipientes c.s.p. 100%

MYLVA S.A.
Vía Augusta, 48
08006 Barcelona
Tel. 902 109 114
mylva@mylva.eu
www.mylva.es

* Etiqueta no válida. Emitida solo como información del producto.

* La etiqueta puede sufrir cambios a consecuencia de una modificación de la resolución administrativa, **por lo que la versión que prevalecerá será siempre la etiqueta del producto.**